

## ヨード造影検査 に伴うビグアナイド系糖尿病薬の休薬について

@PATIENTNAME 様

今回実施するヨード造影剤を用いた検査は、ビグアナイド系の糖尿病薬(別表参照)を服用されている方に対して、非常にまれではありますが、意識障害や脱水症状、嘔吐・腹痛、呼吸異常、痙攣などの副作用を生じることがあります。このため、ビグアナイド系糖尿病薬を一時的に休薬するなど適切な処置を行うことが推奨されています。

担当医の指示により、ヨード造影剤使用日より**48時間前**から、もしくは当日から、服用を中止してください。また、検査後も**48時間**は服用なさらないで下さい。特に、腎機能が低下している方の場合、検査後、腎機能の悪化がないことを確認してから服用再開となりますので、担当医の指示に従って下さい。

### ● 患者さまへ

次の期間、ビグアナイド系糖尿病薬を休薬してください。

- 検査当日 ~ 年 月 日
- 年 月 日 ~ 年 月 日
- 年 月 日 ~ 担当医の指示する日まで

担当医 @USERNAME 印

### ● 患者さまから

- 次の日付より、休薬しています。

年 月 日 から

患者署名

※休薬しなかった場合、造影剤を使用しない検査に変更、または検査を延期させていただくことがありますのでご了承ください。

ご不明な点は下記へお問い合わせください。

東京北医療センター 放射線室 電話 **03-5963-3311**(代)